

## 緊急避妊に関するオンライン診療 説明 【本人様保存】

### 【緊急避妊薬 レボノルゲストレル（保険外診療）】


- 妊娠を緊急的に阻止する方法のひとつです。
- 心配な性交後72時間（3日）以内に、1錠内服します。

おくすりが使えない方	おくすりを使うことに注意が必要な方
<ul style="list-style-type: none"> <li>＊ くすりの成分に過敏症のある方</li> <li>＊ 肝臓に重篤な障害のある方</li> <li>＊ 妊娠中の方</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>＊ 肝臓に障害がある方</li> <li>＊ 心臓に疾患のある方</li> <li>＊ 腎臓に疾患のある方</li> </ul>

### 【使用上の注意】

- 妊娠を100%回避できるわけではありません。
- 通常の避妊用ピルのように、計画的に妊娠を阻止するものではありません。


くすり内服のタイミングと妊娠阻止率



### 【服用後の注意】

- 内服後2時間以内に吐いてしまった場合はもう一度内服が必要です。
- 内服後も妊娠する可能性があり、その後も適切な避妊が必要です。
- 内服後も妊娠検査キット等で妊娠の有無を確認、基礎体温の変化を確認する必要があります。
- 3週後に婦人科診察（通常診察）を受けられることをお勧めします。
- 月経と似た出血（くすりの副作用による出血、妊娠初期の出血など）と、月経の区別ができないことがあります。出血があっても、月経が来たと安心してはいけません。
- 内服後に月経のような出血、少量の不正出血、頭痛、吐き気、体のだるさなどが起きることがあります。
- 月経周期、出血量、期間などに一時的な変化が見られることがあります。通常の避妊用ピルのように、計画的に妊娠を阻止するものではありません。

主な副作用



## 緊急避妊に関する同意書【提出用】

操健康クリニック 担当医 様

緊急避妊薬の処方をお願いいたします。

服用にあたり、緊急避妊薬の効果や注意事項、ならびにその副作用について十分に説明を受け、理解をいたしました。

また、緊急避妊薬を服用しても、必ずしも妊娠を回避できるわけではないことを理解いたしました。

受診者氏名（自著）： \_\_\_\_\_

保護者氏名（家族、その他）： \_\_\_\_\_ 続柄 \_\_\_\_\_

最終月経： 西暦 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日から \_\_\_\_\_ 日間

性交渉日時：西暦 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 \_\_\_\_\_ 時ころ（月経周期の \_\_\_\_\_ 日目）

記入日：西暦 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 \_\_\_\_\_ 午前・午後 \_\_\_\_\_ 時 \_\_\_\_\_ 分

### 【その他の注意事項】

- 同意書は来院時に必ず提出してください。提出いただけない場合は処方できません。
- 顔認識のできる身分証明書（運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、学生証など）を提示いただき、コピーさせていただきます。あらかじめご了承ください。
- オンライン診療システム使用のため、管理会社への別途料金負担があります。【550円税込】
- 時間外での対応のため、全てオンライン診療時のクレジットカード決済となります。
- おくすりは全て院内処方です。当院での受け渡しは24時間対応いたします。
- おくすりの郵送、院外処方のご依頼はお受けしかねます。
- 来院前に電話（058-274-0330）にて、来院時刻をご連絡ください。
- 時間外（18:00以降）来院の場合は、別紙案内図を参照ください。
- 原則、来院時に担当者の前でおくすりを内服いただきます。
- 内服後3週間後に婦人科受診をお勧めします。